



Juan Carlos Melchor y José Manuel Bajo Arenas.

GINECOLOGÍA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las hemorragias son las responsables del 23% de la mortalidad tras el parto

■ Redacción

El 23 por ciento de la mortalidad después del parto se debe a las hemorragias. "Es una complicación urgente que en ocasiones no está lo suficientemente valorada", ha explicado José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Es una complicación asociada tanto con el parto vaginal como con la cesárea y se suele presentar en entre el 5 y el 15 por ciento de los partos. La causa principal es la atonía uterina, que puede darse por una prolongación del tiempo en la tercera fase del parto, "momento clave para evitar la aparición de complicaciones".

Por su parte, Juan Carlos Melchor, presidente de la

Sección de Medicina Perinatal de la SEGO, ha indicado que se recomienda aplicar medidas de prevención, conocidas como manejo activo del alumbramiento, a todas las mujeres tras el parto. En concreto, para evitar la atonía se emplean fármacos uterotónicos.

Con respecto a la prevención de estas hemorragias, los dos ginecólogos han destacado el papel del análogo de la oxitocina de acción prolongada carbocitocina, comercializada por la compañía Ferring bajo el nombre de *Duratoba*. El fármaco está indicado en la prevención de la hemorragia tras cesárea. "Su función es ayudar a la contracción uterina, necesaria para evitar la hemorragia tras el parto".